

この箱の記載事項は服用前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管してください。

ビタミンEC主薬製剤

# ビガシーEC

## ⚠ 使用上の注意

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の診断を受けた人 フェニルケトン尿症

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

便秘、下痢

4. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

# ビタミンEC主薬製剤 ビガシーEC

## 【効能・効果】

- 次の諸症状の緩和：  
しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：  
肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血  
(ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください。)
- 次の場合のビタミンECの補給：  
肉体疲労時、病中病後の体力低下時、老年期

## 【成分・分量】 3包(6 g) 中

アスコルビン酸(ビタミンC) ..... 2,000 mg  
酢酸d-α-トコフェロール(ビタミンE) .. 300 mg  
リポフラビン酪酸エステル(ビタミンB<sub>2</sub>) ... 1.2 mg  
添加物として還元麦芽糖水アメ、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、レモン油、香料、トコフェロールを含有します。

(1) 尿及び大便の検査を受ける場合には、本剤を服用していることを医師にお知らせください。(尿及び大便の検査値に影響をおよぼすことがあります。)

(2) 本剤に配合されているリポフラビン酪酸エステル(ビタミンB<sub>2</sub>酪酸エステル)により、尿が黄色になることがあります。

## 第3類医薬品

## 【用法・用量】

次の量を服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	2~3回
11歳以上15歳未満	2/3包	(ただし、1日2回服用する場合は6時間以上、1日3回服用する場合は4時間以上の間隔をおいてください。)
7歳以上11歳未満	1/2包	
3歳以上 7歳未満	1/3包	
1歳以上 3歳未満	1/4包	
1歳未満	服用しないこと	

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 1包を分割服用した残りは、袋の口を折って湿気の少ない涼しい所に保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

T1202E

## シュガーフリー

本剤は砂糖、ブドウ糖、乳糖などの糖類を使用していません。

## ナトリウムフリー

塩分の取りすぎが気になる方のために、本剤は添加物も含めてナトリウムを含んでいません。

### ■お問い合わせ先

日野薬品工業株式会社 お客様相談窓口  
電話0748-52-1232 9時~17時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

使用期限

製造番号



製造販売元

 日野薬品工業株式会社  
滋賀県蒲生郡日野町上野田119

