

かぜの 初期症状に

液体の
かぜ薬

葛根湯

エキス製剤

ハイカゼ内服液K

さむけ
発熱
鼻水
のどの痛み 30mL

第2類医薬品

△使用上の注意

※してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）
短期間の服用にとどめ、連用しないでください

■相談すること 1 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。(4) 胃腸の弱い人。(5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3.5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【成分・分量】1日量3本(90mL)中

葛根湯エキス……………8300mg
 カッコン 8.0g、マオウ 4.0g、タイソウ 4.0g、ケイヒ 3.0g }より製した
 シャクヤク 3.0g、カンゾウ 2.0g、ショウキョウ 1.0g }エキス
 添加物として、白糖、D-ソルビトール、果糖ブドウ糖液糖、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、エタノール、グリセリン、トメントール、プロピレングリコール、パニン、ベンジルアルコール、香料を含有する。

【効能・効果】かぜの初期の諸症状（発熱、寒け、頭痛、肩・首筋のこばり、鼻閉、鼻水、のどの痛み）

【用法・用量】成人（15歳以上）1回1本、1日3回食間に服用してください。まれに微量の沈殿が生じる場合があるので、よく振ってから服用してください。●(1)用法・用量を厳守してください。(2)15歳未満の小児には服用させないでください。(3)成人（15歳以上）は1回1本とし、1日3本を超えて服用しないでください。(4)本剤は1回1本の服用で飲みきり、飲み残しのないようにしてください。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）(4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元 株式会社 廣習堂
 富山市南町2丁目9-1
 (お客様相談窓口) 電話076-424-2259
 副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

64A3

使用期限

製造記号

30mL×3本入り

7つの生薬の抽出エキス



液体なので
効き目が早く
現れます。



★眠くなる成分を含まない

●こんなシーンでも大丈夫



車の運転



仕事中

★カフェインを含まない

●ぐっすり眠れて

かぜの治りを
早める効果
があります。

