

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
 また必要ときに読めるよう大切に保管して下さい。

漢方「香蘇散末」配合 **総合かぜ薬ラドン顆粒A** 第②類医薬品

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰

薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気等があらわれることがあります)

4. 服用前後は飲酒しないでください

5. 長期連用はしないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。
- (5) 高齢者。
- (6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。高熱、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰

ショック
(アナフィラキシー) 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

皮膚粘膜眼症候群(スティーブス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなツブツブ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。

肝機能障害 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

ぜんそく 息をすときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

再生不良性貧血 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。

無顆粒球症 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

腎障害 発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

■用法・用量

次の量を1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人（15歳以上）	1包	1日3回
11歳以上15歳未満	2/3包	
7歳以上11歳未満	1/2包	
3歳以上7歳未満	1/3包	
3歳未満の幼児	服用しないこと	

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法、用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■成分・分量

成分	1日量(3包)中	作用
香蘇散末 (コウブシ末 800mg、ショウキョウ末 200mg、 ソコウ末 400mg、カンクウ末 200mg、 チンピ末 600mg)	2,200mg	普段から胃腸虚弱で、抑うつ傾向にある人のかぜの初期に効果があります。
エテンザミド	600mg	持続性があり、痛みをおさえ、熱を下げます。
アセトアミノフェン	540mg	早く吸収され、痛みをおさえ、熱を下げます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	くしゃみ、鼻水等のアレルギー症状をおさえます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支を広げ、呼吸を楽にし、せきをしずめます。
無水カフェイン	75mg	痛みをおさえるはたらきを助けるほか、頭痛をやわらげます。

添加物として安息香酸、カルメロースカルシウム、ポビドン、タルク、香料を含有します。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 配置期限（外装に記載）をすぎた製品は服用しないでください。

■お問い合わせ先

本剤につきましてのお問い合わせは、下記をお願いいたします。

布亀株式会社 お客様相談室

TEL : (0798) 35-9985

受付時間：午前9:00～午後5:00（土、日、祝日を除く）

発売元 布亀株式会社
〒663-8585 兵庫県西宮市今津二葉町3番6号
製造販売元 新新薬品工業株式会社
〒930-2221 富山県富山市今市324番地

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931