

品目番号 追12-59-229

2012年9月改訂

(記載要領変更に伴う改訂)

使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

殺菌消毒薬

第2類医薬品

# フタバダイア®軟膏S

(殺菌剤クロルヘキシジン塩酸塩配合)

「フタバダイア軟膏S」は、殺菌剤クロルヘキシジン塩酸塩のはたらきで傷口を殺菌・消毒する親水性の軟膏です。

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には、長期間又は広範囲に使用しないでください

(1) 粘膜 (2) 創傷面 (3) 炎症部位



### ■【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 患部が広範囲の人。
- (4) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

(裏面もご覧ください。)

## 〔効能・効果〕

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒

## 〔用法・用量〕

1日数回患部にすり込むか、ガーゼに延ばして貼付する。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 本剤は、外用にのみ使用し、内服しないでください。

## 〔成分・分量〕（100 g 中）

成分名	含量	はたらき
クロルヘキシジン塩酸塩	0.2 g	殺菌剤 広範囲の細菌に対して殺菌作用を持っています。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	0.5 g	抗ヒスタミン剤 アレルギー反応によるかゆみを和らげます。
アラントイン	1.0 g	皮膚組織修復剤 損傷した皮膚組織の修復を促進します。

添加物として、ステアリルアルコール、軽質流動パラフィン、モノステアリン酸グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アジピン酸ジイソプロピル、モノステアリン酸バチル、プロピレングリコール、モノステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸メチル、エドト酸ナトリウム水和物を含有します。

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) お子様の手のとどかない所に保管してください。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 配置期限（ケースに表示）を過ぎた製品は使用しないでください。

## 〔お問い合わせ先〕

新新薬品工業株式会社 お客様相談室

TEL:076-435-1166 (代表) 受付時間 午前9:00～午後5:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 **新新薬品工業株式会社** 富山県富山市今市324番地  
〒930-2221

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931