

# かゆい水虫・たむしに1日1回で効く キョータップ<sup>®</sup>TFクリーム EX

第2類医薬品 水虫治療剤

## 製品特長

- (1) テルピナフィン塩酸塩の優れた殺真菌作用と角質浸透性により、1日1回の塗布で水虫・たむしに優れた効果を発揮します。
- (2) かゆみ止め成分（ジフェンヒドラミン塩酸塩）と局所麻酔成分（リドカイン）が素早くかゆみを鎮めます。
- (3) グリチルレチン酸が患部の炎症を抑えます。
- (4) イソプロピルメチルフェノールの殺菌作用で雑菌の繁殖を抑えます。
- (5) べとつかず、サラッとした使用感のクリームで、ジुकジुकした患部に適しています。



## 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は使用しないでください。  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください。
  - (1) 目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等
  - (2) 湿疹
  - (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 乳幼児
  - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (5) 患部が顔面又は広範囲の人
  - (6) 患部が化膿している人
  - (7) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人  
（陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。）
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	かぶれ、刺激感、熱感、 <sup>りんせつ</sup> 鱗屑・ <sup>らくせつ</sup> 落屑（フケ、アカのような皮膚のはがれ）、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮膚の亀裂、痛み、色素沈着、発疹・発赤、かゆみ、はれ、 <u>じんましん</u>

3. 2週間位使用しても症状が良くならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合は、使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

®登録商標

## 【効能・効果】

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

（裏面もご覧ください。）

## 【用法・用量】

1日1回、適量を患部に塗布してください。

### <用法・用量に関する注意>

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。
- (6) 本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。

## 【成分・分量】(100g中)

成分	分量	はたらき
テルビナフィン塩酸塩	1.0 g	殺真菌作用で白癬菌（水虫菌）を殺菌します。
リドカイン	2.0 g	局所麻酔作用でかゆみを和らげます。
グリチルレチン酸	0.5 g	患部の炎症を抑えます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	0.5 g	かゆみを鎮めます。
イソプロピルメチルフェノール	0.3 g	殺菌作用で雑菌の繁殖を抑えます。

添加物として、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、ミリスチン酸オクチルドデシル、イソステアリン酸、ステアリルアルコール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、1,3-ブチレングリコール、カルボキシビニルポリマー、エデト酸ナトリウム水和物、パラオキシ安息香酸メチル、トリエタノールアミンを含有します。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4) 使用期限（ケース及びチューブに表示）を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってなるべく速やかに使用してください。

### 水虫治療のポイント

1. 清潔 患部も衣類（靴下）もこまめに洗って清潔にしてください。
2. 乾燥 患部の乾燥を心がけてください。
3. 根気 かゆみなどの症状がなくなった後も、約1ヶ月は根気よく治療を続けてください。

## 【お問い合わせ先】

新新薬品工業株式会社 CHC事業部 お客様相談室

電話番号 076-435-0878

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

【製造販売元】新新薬品工業株式会社 〒930-2221 富山県富山市今市324番地