

服用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

あまくてのみ良い子供かぜ薬

第②類医薬品

かぜの 熱・せき・いたみに 保寿小児ポツポ

「かぜ」にかかると全身がだるくなり、さらに体力を消耗して思わぬ病気をひき起こすこともなります。昔から「かぜ」は万病のもと、と言われてきました。「かぜ」は初期のうちに治すのが肝要です。軽い症状のうちに早めに手当し、充分な休養・栄養をとりましょう。本剤は憂うつな「かぜ」の諸症状をやわらげ体調を整え、元気な体になります。

⚠ 使用上の注意

本剤は小児用ですが、かぜ薬に定められた注意事項として、成人が服用される際のことも記載してあります。

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

1. 次の人は服用しないこと。（1）本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。（2）本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと。他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。（眠気があらわれることがあります。）
4. 服用前後は飲酒しないで下さい。5. 長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。（1）医師又は歯科医師の治療を受けている人。（2）妊娠又は妊娠していると思われる人。（3）授乳中の人。（4）水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15歳未満）。（5）高齢者。（6）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。（7）次の症状のある人。高熱、排尿困難（8）次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経科	めまい
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振	泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下		

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック （アナフィラキシー）	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しき、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）中毒性表皮壊死融解症・急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしただけでも息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
腎 障 害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛、下痢等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無 顆 粒 球 症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。 口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなるらない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和。

用法・用量

次の量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用して下さい。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
7歳以上～11歳未満	1包	3回
5歳以上～7歳未満	$\frac{2}{3}$ 包	
3歳以上～5歳未満	$\frac{1}{2}$ 包	
1歳以上～3歳未満	$\frac{1}{3}$ 包	

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (2) 2歳未満の幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させて下さい。

成分・分量

1日量（3包：1包…0.6g）中

はたらき	成 分	含量
かぜによる不快なたん、せきを抑えます	ノスカピン	24mg
	dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩	24mg
かぜによる悪寒や発熱をおさえ、頭痛や関節、筋肉の痛みをしずめます。	エテンザミド	300mg
	アセトアミノフェン	270mg
	無水カフェイン	45mg
かぜによるくしゃみ、鼻みず、鼻づまりといった諸症状を緩和します。	クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.75mg

添加物として、サッカリンナトリウム水和物、グリチルリチン酸モノアンモニウム、乳糖水和物、パレシヨアンブ、軽質無水ケイ酸、赤色3号色素、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えしないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

本品についてのお問い合わせ先 富山薬品株式会社
 お客様相談窓口 ☎(076)435-0139
 受付時間9:00～17:00(土、日、祝日を除く)
 副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元：富山薬品株式会社
 富山市四方西岩瀬石瀬175

