

服用に際しては、説明文書をよく読むこと

【薬効名】ビタミン含有保健薬

【販売名】マムシゲン内服液

【使用上の注意】相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
関係部位：症状 皮膚：発疹・発赤、かゆみ
消化器：胃部不快感、下痢
2. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体的疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1瓶(100mL)を服用してください。
*15歳未満は服用しないこと。
<用法・用量に関連する注意>
定められた用法・用量を厳守すること。

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

第3類医薬品



100mL

S2

ガラス：瓶
金属：キャップ

【成分・分量】 成人1日(100mL)中
日局チアミン硝酸化物(ビタミンB₁硝酸塩)10mg、
日局リボフラビンリン酸エステルナトリウム
(ビタミンB₂リン酸エステル)3mg、日局ニコ
チン酸アミド 20mg、日局タウリン 500mg、
カルニチン塩化物 100mg、日局無水カフェイン
50mg、ゴオウ抽出液(原生薬換算：0.5mg)10mg、
マムシ抽出液(原生薬換算：100mg)0.5mL、
ロクジョウ抽出液(原生薬換算：14.5mg)50μL
添加物：果糖ブドウ糖液糖、ハチミツ、DL-リンゴ酸、
安息香酸Na、パラベン、エタノール、香料(バニ
リンを含む)、アルコール(0.35mL以下)を含有
成分・分量に関連する注意

- (1) 本剤に配合されているビタミンB₂リン酸エステルにより、尿が黄色くなることがあります。
- (2) 本剤に配合されている生薬成分により、混濁又は沈殿を生じることがありますが、品質の問題はありません。よく振ってお飲みください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になり品質が変わる)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

【お客様相談室】 電話 06-6131-1300
(祝祭日を除く月～金曜日 10:00～17:00)

【製造販売元】

株式会社 阪本漢法製薬
大阪市北区曾根崎2丁目7番4号
<http://www.sakampow.com>

製造番号

使用期限