

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

胃腸薬

## 立山胃腸薬A

第2類医薬品

立山胃腸薬Aは、10種類の生薬からなる胃腸薬です。それぞれの生薬は古くから胃腸薬として使われてきたもので、健胃、制酸、鎮痛などはたらきを持っています。食べ過ぎ、飲み過ぎ、食欲不振、むかつきなど、胃腸の不快感な症状にお役立てください。

### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 次の診断を受けた人。  
腎臓病
2. 次の場合は、服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください  
2週間位服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください  
便秘

### 効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部・腹部膨満感、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、げっぷ（おくび）、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、飲み過ぎ（過飲）、胃痛、胃重、食欲不振（食欲減退）、消化不良、胃弱、食べ過ぎ（過食）

（裏面もお読みください。）

## 用法・用量

次の量を、食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15才以上)	1 包	3回
11才以上15才未満	2 / 3包	
8才以上11才未満	1 / 2包	
5才以上 8才未満	1 / 3包	
3才以上 5才未満	1 / 4包	
3才未満	服用させないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成分・分量 3包(成人1日量)中 (1包:1.4g)

成 分	分 量	はたらき
ボレイ末	1400mg	制酸
オウレン末	38mg	苦味健胃
オウバク末	190mg	苦味健胃
ケイヒ末	250mg	芳香性健胃・駆風
ショウキョウ末	86mg	健胃・食欲増進・駆風
ウイキョウ末	88mg	芳香性健胃・駆風
チョウジ油	3mg	芳香性健胃
ホップ末	270mg	芳香性苦味健胃・食欲増進
サンザシ末	1400mg	健胃・消化促進
カンゾウ末	345mg	鎮痛・鎮痙

添加物としてL-メントール、デヒドロ酢酸Na、ヒドロキシプロピルセルロースを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 表示の期限を過ぎたものは服用しないでください。

## お問い合わせ先

くすり相談窓口:電話(076)435-5055  
午前9時から午後4時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **第一薬品工業株式会社**  
富山市草島 15-1