

肩こり

鎮痛消炎プラスター
ビタミンE配合

配置期間

製造販売者

111



nunokame

布亀パスE

こりと痛みに

肩のこり 筋肉痛 関節の痛み しもやけ
腰の痛み 筋肉疲労 打撲・捻挫 骨折の痛み

血行をよくする心地よいプラスター剤

ビタミンE配合

第3類医薬品

気孔付

L size : 10 sheets (12.4cm×7.0cm) / S size : 8 sheets (7.4cm×5.2cm)

肩こり 布亀パスE ビタミンE配合

第3類医薬品

気孔付

第3類医薬品

布亀パスE
ビタミンE配合

肩こり 肩こり

鎮痛消炎薬

布亀バスE こりと痛みに

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1. 次の人は使用しないこと
天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 2. 次の部位には使用しないこと
(1) 目の周囲、粘膜等。 (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

☒ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

● 効能又は効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

● 成分及び分量 本品1.0m³(膏体144.81g)中

d ₆ -カンフル	1.80 g
サリチル酸メチル	9.00 g
ハッカ油	1.20 g
l-メントール	4.50 g
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)	0.50 g
ノニル酸フニリラミド	0.01 g
添加物として、 ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、 沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチル ヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、天然 ゴムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号を含有します。	

第3類医薬品

● 用法及び用量

1日1~2回、ライナーをはがし、患部に貼ってください。

【用法及び用量に関する注意】

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児で使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (6) 皮膚特に弱い人は、同じ部位に続けて貼らないでください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 開封後は袋の口を折り曲げ、外箱に入れて保管してください。
- (5) 配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

内容量 大判 12.4cm×7.0cm・10枚入 小判 7.4cm×5.2cm・8枚入

計18枚 ￥550+税

発売元 布亀株式会社 西宮市今津二葉町3番6号

製造販売元 大協薬品工業株式会社 富山市水橋島等173

お客様相談窓口 電話:076-479-1313

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

